

Protege a tu bebé desde el embarazo. Conoce sobre el Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

El virus sincitial respiratorio (VSR) es una de las principales causas de infecciones respiratorias en niños pequeños, especialmente en menores de 2 años. Puede provocar enfermedades graves como bronquiolitis o neumonía, que a veces requieren hospitalización.



Datos importantes

Cada año, el VSR causa aproximadamente:

33 millones
infecciones respiratorias
en menores de 5 años.

Más de
100.000
muertes infantiles.

3,6 millones
de hospitalizaciones.

En Colombia, se estiman
181.578 episodios
en niños de 0 a 5 años (2025).

¿Cómo se contagia?

El virus se transmite fácilmente de persona a persona:

Por el aire:



Cuando alguien infectado tose o estornuda.

Por contacto directo:




Al tocar superficies contaminadas (juguetes, mesas, manijas) y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos.

¿Quiénes están en mayor riesgo?



Prematuros, recién nacidos y menores de 2 años.



Niños con enfermedades del corazón, pulmones o defensas bajas.



Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Reconoce los signos y síntomas



Tos persistente.



Fiebre.



Dificultad para respirar.



Congestión o secreción nasal.



Falta de apetito o rechazo al alimento.



Silbidos al respirar (sibilancias).




Irritabilidad o dificultad para dormir.



Si tu bebé presenta estos síntomas, consulta al servicio de salud de inmediato.

Infecciones más graves causadas por el VSR

Bronquiolitis:



Inflamación de las pequeñas vías respiratorias.

Neumonía:



Infección de los pulmones.



Infecciones más graves causadas por el VSR



Vacunación materna durante el embarazo.

Se aplica entre las semanas 32 y 36 con una sola dosis.

Los anticuerpos pasan al bebé, protegiéndolo desde el nacimiento hasta los 6 meses.

Es una medida segura y eficaz para prevenir enfermedad respiratoria grave.

**Vacunarte en el embarazo es una forma de decirle a tu bebé:
“Te cuido desde antes de nacer.”**



Protección en recién nacidos.

Si la madre no recibió la vacuna durante el embarazo, el bebé puede recibir un anticuerpo protector contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

Se aplica una dosis intramuscular al recién nacido.

Brinda protección inmediata hasta los 6 meses de edad.



Medidas generales de prevención

- * Usa tapabocas si tienes síntomas respiratorios.
- * Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios.
- * Lava tus manos con frecuencia.
- * Limpia y desinfecta los objetos y superficies que usa el bebé.
- * No fumes cerca de los niños.

Protegerte durante el embarazo es proteger también a tu bebé.



Tomar la decisión de vacunarte durante el embarazo, puede marcar la diferencia entre una enfermedad respiratoria grave y un comienzo de vida saludable.



Centro de Investigaciones

Carrera 18 # 82 – 39 piso 8.
Bogotá D.C – Colombia

Horario:
De lunes a viernes
07:30 a.m. a 05:00 p.m.

Teléfono:
+57 601 3905099
Ext. 2908 – 2909

Celular y WhatsApp:
+57 316 553 0042

Email:
investigamos@clinicadelcountry.com

